

COEFICIENTES DE AGOSTADERO POR ENTIDAD  
(Hectáreas/Unidad animal)

Año	Entidad federal	Coeficiente Mínimo	Coeficiente Máximo	Coeficiente Ponderado
2002	Aguascalientes	7.05	27.86	11.56
	Baja California	15.00	45.00	33.92
	Baja California Sur	28.00	80.00	52.17
	Campeche	1.49	16.40	3.60
	Coahuila	9.90	77.10	26.02
	Colima	1.50	12.45	3.77
	Chiapas	0.80	18.90	1.80
	Chihuahua	8.00	60.00	20.07
	Distrito Federal	5.05	19.68	11.35
	Durango	4.50	41.44	15.70
	Guanajuato	6.67	28.14	10.20
	Guerrero	1.50	14.50	6.15
	Hidalgo	0.80	38.55	6.41
	Jalisco	1.92	25.64	8.50
	México	5.05	23.42	9.33
	Michoacán	1.50	24.46	7.00
	Morelos	6.70	19.68	10.85
	Nayarit	2.07	26.60	6.35
	Nuevo León	4.30	49.20	22.57
	Oaxaca	0.80	33.40	4.12
	Puebla	0.90	33.40	7.82
	Querétaro	3.25	38.72	13.49
	Quintana Roo	1.44	16.40	3.72
	San Luis Potosí	2.00	61.56	9.80
	Sinaloa	1.87	29.10	9.07
	Sonora	13.00	46.00	22.36
	Tabasco	0.80	16.40	1.94
	Tamaulipas	2.13	30.15	11.35
	Tlaxcala	4.96	24.43	10.10
	Veracruz	0.80	26.34	1.81
	Yucatán	1.98	16.40	4.37
	Zacatecas	4.92	58.84	14.49

Notas por Variable

Notas Generales

Los coeficientes de agostadero son permanentes. Se calculan para condiciones naturales, es decir, sin considerar el disturbio provocado por mal uso o mejoras de las condiciones de los sitios evaluados. Tienen carácter legal y son vigentes para determinar el tamaño de la pequeña propiedad ganadera. Sin embargo, para fines de manejo actual, los valores que aquí se reportan deberán ajustarse a las condiciones actuales de vegetación, clima, suelo y especie animal que utiliza los recursos de los sitios que se considere, entre otros factores.

La información fue revisada recientemente por Cotecoca (2002), determinando que no era necesaria su modificación.

## Fuente

Elaborado por la Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero (Cotecoca), Sagarpa, con base en: Cotecoca, SARH, Memorias de Coeficientes de Agostadero, años 1972-1986, México.