

COEFICIENTES DE AGOSTADERO POR TIPO DE VEGETACIÓN

Año	Tipo de Vegetación		Superficie (hectáreas)	Coefficiente Mínimo (hectáreas/unidad animal)	Coefficiente Máximo (hectáreas/unidad animal)
2002	Pastizal	Mediano abierto	8,475,925	5.01	20.52
		Mediano arbofrutescente	4,523,758	8.05	23.00
		Mediano arborescente	643,740	11.00	18.24
		Amacollado abierto	2,571,793	7.59	24.34
		Amacollado arborescente	684,534	13.50	18.00
		Amacollado arbofrutescente	784,118	11.37	22.00
		Inducido	13,750	7.41	10.40
		Halófito abierto	2,218,583	7.00	20.37
		Halófito arbofrutescente	2,502,189	9.00	19.00
		Vegetación halófito	1,915,883	7.60	48.19
		Total	24,334,273	sin dato	sin dato
	Matorral	Alto subinerme	2,290,002	10.30	28.73
		Alto espinoso	4,782,490	8.20	29.00
		Mediano esclerófilo	720,592	21.41	25.92
		Mediano parvifolio	13,429,218	14.70	77.10
		Mediano subinerme	7,426,774	12.30	43.00
		Mediano subespinoso	1,108,908	21.90	48.00
		Mediano espinoso	4,016,842	8.79	35.46
		Mediano crasicaulescente espinoso	24,689	23.00	23.00
		Bajo subespinoso	468,611	24.00	40.00
		Bajo espinoso	238,639	7.46	25.20
		Bajo crasifolio	3,134,709	50.00	80.00
		Crasicaule	613,186	9.16	24.63
		Arbocrasicaulescente	2,639,008	12.60	60.00
		Arborescente	2,319,540	9.80	44.00
		Arbofrutescente	4,516,542	17.00	60.00
		Mediano parvifolio crasicaulescente	3,698,710	23.00	46.00
		Crasirosulifolio espinoso	7,653,211	14.10	61.25
		Sarcocaula	921,566	25.20	50.00
		Sarcocrasicaulescente subinerme	911,086	34.00	60.00
		Oligocilindrocaule afilo	218,291	13.96	34.70
		Vegetación de dunas	1,024,723	54.00	60.00
		Total	62,157,337	sin dato	sin dato
	Bosque	Aciculifolio	14,044,509	2.90	35.60
		Aciculi-esclerófilo	11,257,545	2.00	30.77
		Aciculi-linerifolio	444,188	2.00	32.80
		Aciculi-escumifolio	370,845	18.90	21.40
		Esclerófilo-caducifolio	10,454,935	3.24	33.01
		Esclero-aciculifolio	2,639,362	8.18	33.20
		Esclero-escumifolio	101,649	17.00	26.30
		Esclerófilo-subcaducifolio	25,218	10.40	10.40
		Linearifolio	432,724	10.25	18.55
		Escumifolio	664,720	6.36	32.80
		Caducifolio	1,422,699	1.10	20.00
		Caducifolio espinoso	3,148,221	5.47	27.40
		Esclerófilo perennifolio	542,076	0.80	18.60
		Oligocilindrocaule rosulifolio	425,906	17.35	43.52
		Páramos de altura	18,764	24.60	24.60
		Vegas arboladas	39,309	4.50	4.50
		Total	46,032,670	sin dato	sin dato
	Selva	Alta perennifolia	7,876,474	0.80	3.44
		Alta subperennifolia	823,178	2.54	2.54
		Alta subcaducifolia	333,601	1.20	2.00
		Mediana subperennifolia	9,914,679	0.80	6.84
		Mediana subcaducifolia	7,675,304	0.90	8.58
		Mediana caducifolia	1,953,361	2.00	5.30

COEFICIENTES DE AGOSTADERO POR TIPO DE VEGETACIÓN

Año	Tipo de Vegetación		Superficie (hectáreas)	Coeficiente Mínimo (hectáreas/unidad animal)	Coeficiente Máximo (hectáreas/unidad animal)
2002	Selva	Mediana subcaducifolia subespinosa	15,249	3.80	3.80
		Mediana perennifolia subespinosa	8,133	2.10	2.10
		Baja caducifolia	15,587,181	1.30	32.04
		Baja caducifolia espinosa	2,071,471	1.95	12.00
		Baja subperennifolia espinosa	789,861	7.00	7.80
		Baja caducifolia subespinosa	322,472	6.30	14.00
		Baja subperennifolia	231,353	3.60	4.36
		Baja perennifolia	95,000	2.30	2.30
		Baja subcaducifolia	92,254	4.30	4.90
		Baja subperennifolia subespinosa	17,816	2.00	2.50
		Baja subcaducifolia espinosa	11,323	13.66	13.66
		Total	47,818,710	sin dato	sin dato
	Otras superficies	Total	16,374,310	sin dato	sin dato
	Total	Total	196,717,300	sin dato	sin dato

Notas por Variable

Notas Generales

La clasificación por tipo de vegetación se basa en la clasificación de Miranda y Hernández X., 1963.

La información de este cuadro fue revisada recientemente por Cotecoca (2002), determinando que no era necesaria su modificación.

Total: De acuerdo con estimaciones recientes del INEGI acerca de la superficie continental del país, ésta es 195 924 800 hectáreas, con base en el Marco Nacional actualizado en 1996 de la carta topográfica escala 1:250 000.

Los coeficientes de agostadero son permanentes. Se calculan para condiciones naturales, es decir, sin considerar el disturbio provocado por mal uso o mejoras de las condiciones de los sitios evaluados. Tienen carácter legal y son vigentes para determinar el tamaño de la pequeña propiedad ganadera. Sin embargo, para fines de manejo actual, los valores que aquí se reportan deberán ajustarse a las condiciones actuales de vegetación, clima, suelo y especie animal que utiliza los recursos de los sitios que se considere, entre otros factores.

Fuente

Elaborado por la Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de Agostadero (Cotecoca), Sagarpa, con base en: Cotecoca, SARH, Memorias de Coeficientes de Agostadero, años 1972-1986, México.