

Nombre:	Concentración del ozono estratosférico: global, sobre Antártica y sobre dos ciudades mexicanas.
Definición breve:	Concentración del ozono estratosférico: global, sobre Antártica y sobre las ciudades de México y Guadalajara.
Unidad de medida:	Unidades Dobson.
Objetivos y metas:	No aplica.
Definiciones y conceptos:	Unidad Dobson: unidad empleada para expresar el grosor de la capa de ozono. Cien unidades Dobson representan una cantidad equivalente a 1mm de grosor de la capa de ozono, a nivel del mar y a 0°C (Environment Canada, 2002).
Método de medición:	Los datos provienen del Total Ozone Mapping Spectrometer (TOMS) y de Aura Validation Data Center de la NASA que ha empleado a lo largo de los años diferentes satélites. La concentración global de ozono es un promedio anual de las mediciones realizadas entre las latitudes 65°N y 65°S. Para la Antártica se calcularon los promedios de octubre (considerado el mes en que se abre el "agujero de ozono"), a partir de mediciones diarias. Los datos corresponden a la región conocida como Bahía Halley, Antártica ubicada en la latitud 75°S. Para la Ciudad de México y Guadalajara, se calcularon los promedios anuales a partir de registros diarios y corresponden a las latitudes 20°N y 19°N respectivamente.
Periodicidad:	Anual.
Limitaciones del indicador:	La precisión de los satélites empleados indica que en general las tendencias de 1.5% por década no pueden distinguirse de cero (NASA, 2003).
Fuentes de datos:	NASA. <i>Total Ozone Mapping Spectrometer</i> . 2003. NASA. <i>Aura Validation Data Center</i> . Disponible en: http://avdc.gsfc.nasa.gov/index.php?site=677741240 Fecha de consulta: agosto de 2016. NASA. <i>Ozone Monitoring Instrument (OMI)</i> . 2014. Disponible en: ftp://toms.gsfc.nasa.gov . Fecha de consulta: agosto de 2014.
Referencia:	Environment Canada. Environmental Signals: Canada's National Environmental Indicator Series 2003. Canada. 2002. NASA. Total Ozone Mapping Spectrometer. Enero de 2011. Disponible en: http://toms.gsfc.nasa.gov