

**Blanqueamiento de Coral en arrecifes Mexicanos
(Número de reportes)**

	Alto (>30)	Medio (10-30)	Bajo (1-10)	Desconocido	Total
Año					
1990	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
1991	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1992	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1993	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
1994	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1995	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1996	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1997	1.00	12.00	2.00	0.00	15.00
1998	12.00	2.00	3.00	0.00	17.00
1999	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
2004	11.00	43.00	30.00	0.00	84.00
2005	47.00	163.00	238.00	0.00	448.00
2006	40.00	78.00	70.00	0.00	188.00

NOTAS

Variable	Notas
Número de reporte de grado de daño de los arrecifes coralinos	Blanqueamiento de coral: Se refiere al padecimiento en el cual las algas simbiontes que viven en los tejidos coralinos son expulsadas, lo cual puede causar el debilitamiento o muerte de los corales. El grado de severidad del daño es medido como el porcentaje de corales afectados en una zona. La variable se refiere al número de reportes anuales de blanqueamiento de coral de los arrecifes mexicanos. Estos reportes se clasifican con base en el grado de deterioro, que se refiere al porcentaje de corales afectados por el evento en el sitio de estudio: bajo (1-10%), medio (10-30%), alto (mayor al 30%).

FUENTES

World Fish Center - International Coral Reef Action Network, ReefBase: A Global Information System on Coral Reefs, , <http://mari-biotech.nstl.gov.cn/MirrorResources/4696/index.html>.